

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Catálogo 2026





CHEMOTECNICA

Nuestro modo de ser, nuestra forma de hacer.

Somos una empresa fundada en 1943, dedicada a la elaboración de productos para el **AGRO y SANIDAD AMBIENTAL**, en permanente evolución y desarrollo.

Nos define la **CALIDAD** de nuestros productos y servicios. Desarrollamos nuestra actividad asegurando la **SUSTENTABILIDAD y el cuidado del MEDIO AMBIENTE.**



NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA COMUNIDAD.



El sistema de gestión de HSMA abarca el cuidado de las personas y el medio ambiente de la totalidad de las operaciones del personal propio y contratista dentro de planta, de nuestros proveedores y clientes.

Hemos obtenido todos los certificados bajo el programa de CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE que presenta aspectos de las normas ISO 14001, OSHAS 18001 e inclusive algunos aspectos de la ISO 9001 y tiene en cuenta la Seguridad e Higiene, la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente a través de la certificadora DNV GL.

CHEMOTECNICA es parte de CAMPO LIMPIO, una organización que canaliza el aporte de pequeños, medianos y grandes participantes para un mismo objetivo: Recuperar, Reciclar, Reducir y Reutilizar los envases vacíos de fitosanitarios, generando una economía circular para un CAMPO más LIMPIO.



HERBICIDAS

ACADEMIX ELITE / 2,4-D	5
LUAN / BENAZOLIN-ETIL	5
LUAN PLUS / BENAZOLIN-ETIL + FOMESAFEN	5
TIMBAL / CLETODIM	5
CLOMAX / CLOMAZONE	5
CLOVEN 25 / CLORIMURON ETIL	5
GALOPE / DICAMBA	5
GALOPE ME / DICAMBA ÁCIDO 2-METOXI-3,6-DICLOROBENZOICO	6
ENKIL / DIFLUFENICAN	6
ACADEMIX LV EC / ÉSTER ETILHEXÍLICO de 2,4-D	6
BERSAM /FLUMETSULAM 12%	6
ECLIPSE / FLUMIOXAZIM	6
ROMEL / FLUROCLORIDONA	6
ENTORNO / FLUROXIPIR-MEPTIL	6
SYSMO / FOMESAFEN	7
MIFOS ULTRA / GLIFOSATO	7
MIFOS GRAN / GLIFOSATO	7
LOBUNO / GLUFOSINATO DE AMONIO	7
ANGLAT / HALOXIFOP	7
NOMADE / IMAZETAPIR	7
HUNKY / IMAZAPIR	7
LINUCHEM / LINURON	8
SUNSET / METRIBUZIN	8
SUNSET SC / METRIBUZIN	8
ERRASIN WP / METSULFURON METIL	8
GALGOQUAT 27,6 SL / PARAQUAT	8
ERAWAN / PENDIMETALIN	8
PLENUS / PICLORAM	8
GLENN / S-LACTOFEN	9
CHEMOCLOR / S-METOLACLORO	9
SUPER AZON / SULFENTRAZONE	9
TERBUChem 50 SC / TERBUTILAZINA	9

INSECTICIDAS

OLIMPO MAXX / ABAMECTINA	10
MARDER / ACETAMIPRID-LAMBDACIALOTRINA	10
PARALELO 25 EC / BIFENTRIN	10
GALGOTRIN / CIPERMETRINA	10
ÉPICO / CLORANTRANILIPROLE	10
FOZIL 35 / IMIDACLOPRID	10
SIMBIOSIS MAXX / IMIDACLOPRID + LAMBDACIALOTRINA	10
NEMESIS / LUFENURON	11
RAFTER 25 ME / LAMBDACIALOTRINA	11
VELOX / TIAMETOXAM-LAMBDACIALOTRINA	11

FUNGICIDAS

CRUX / AZOXISTROBINA+CIPROCONAZOLE	12
FUGAZ / AZOXISTROBINA	12
SINFONIA / AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE	12
ENAZIN / CARBENDAZIM	12
TOLLER 72 / CLOROTALONIL	12
REDOMON / FLUAZINAM	12
TREPAK / PROPAMOCARB CLORHIDRATO	12
TRIGAL 43 SC /TEBUCONAZOLE	12

FEROMONAS

CIDETRAK CM AR / DODECADIEENOL	13
CIDETRAK CM PLUS AR / DODECADIEENOL	13
CIDETRAK CM PLUS MESO AR / DODECADIEENOL	13
CIDETRAK CM DA COMBO AR / DODECADIEENOL	13
CIDETRAK CM OFM DUO AR / DODECADIEENOL	13
CIDETRAK DA MEC AR / DODECADIEENOL	13
CIDETRAK EGVM AR / DODECADIEENOL	14
PHEROCON CM DA COMBO AR / DODECADIEENIL + DECADIEENOATO	14
PHEROCON OFM AR / DODECENIL ACETATE	14

COADYUVANTE

GALGOIL 78 / ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE VEGETAL	15
--	----

FITOREGULADOR

NAGIB 10 / ÁCIDO GIBERÉLICO	15
------------------------------------	----



HERBICIDAS



ACADEMIX ELITE / 2,4-D

PRINCIPIO ACTIVO	2,4-D
CONCENTRACIÓN	30%
FORMULACIÓN	Microemulsión
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida selectivo de baja volatilidad y de acción sistémica, destinado a combatir malezas de hoja ancha en determinados cultivos. Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar la deriva del producto.

LUAN / BENAZOLIN-ETIL

PRINCIPIO ACTIVO	Benazolin-etil
CONCENTRACIÓN	50 %
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	10 L

Herbicida sistémico selectivo post-emergente que es absorbido principalmente por las hojas y traslocado rápidamente por el floema en las malezas de hoja ancha. Por su selectividad es recomendado en cultivos de soja y maní.

LUAN PLUS / BENAZOLIN-ETIL + FOMESAFEN

PRINCIPIO ACTIVO	Benazolin-etil + Fomesafen
CONCENTRACIÓN	Benazolin-etil 20 % Fomesafen 13,3 %
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	20 L

Combinación exclusiva de Benazolin-etil y Fomesafen, dos principios activos herbicidas con diferentes mecanismos de acción, especialmente diseñada para control del Yuyo colorado, tanto en pre como en postemergencia del cultivo de soja. Rápida acción y alta persistencia.

TIMBAL / CLETODIM

PRINCIPIO ACTIVO	CLETODIM
CONCENTRACIÓN	24%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida graminicida selectivo de acción sistémica que se utiliza para el control de malezas gramíneas anuales y perennes en post-emergencia. No controla malezas latifoliadas ni ciperáceas. SISTÉMICO, POST-EMERGENTE DE MALEZAS, INHIBIDOR DE LA ACCasa, selectivo para soja, girasol, algodón, poroto.

CLOMAX / CLOMAZONE

PRINCIPIO ACTIVO	CLOMAZONE
CONCENTRACIÓN	48%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida selectivo para los cultivos de arroz, soja y maní; indicado para el control de capín, pasto cuaresma, cola de zorro y otras malezas latifoliadas y gramíneas anuales. La absorción del herbicida se realiza a nivel de meristemas o puntos de crecimiento de la parte aérea de las malezas y también de las raíces.

CLOVEN 25 / CLORIMURON ETIL

PRINCIPIO ACTIVO	CLORIMURON ETIL
CONCENTRACIÓN	25%
FORMULACIÓN	Polvo Mojable
PRESENTACIÓN	100 g

Herbicida post-emergente, para el control de malezas de hoja ancha en el cultivo de soja y pasturas consociadas. Actúa deteniendo el crecimiento de las malezas ni bien es absorbido por ellas. SISTÉMICO,

GALOPE / DICAMBA

PRINCIPIO ACTIVO	DICAMBA
CONCENTRACIÓN	57,8%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	5 L

Herbicida post-emergente, controla malezas de hojas anchas resistentes al 2,4-D o MCPA en: trigo, cebada de cereales de invierno, maíz, sorgo, mijo, pasturas de gramíneas, campos en pastoreo, caña de azúcar, chañar, tusca, duraznillo negro. SISTÉMICO.



HERBICIDAS



GALOPE ME / DICAMBA ÁCIDO 2-METOXI-3,6-DICLOROBENZOICO

PRINCIPIO ACTIVO	DICAMBA ÁCIDO 2-METOXI-3,6-DICLOROBENZOICO
CONCENTRACIÓN	20g y 100ml
FORMULACIÓN	MICROEMULSIÓN
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida postemergente sistémico selectivo para el control en barbecho químico, que se absorbe por hojas y raíces, trasladándose vía floemática y xilemática. Controla malezas de hoja ancha resistentes a 2,4-D o MCPA. Puede utilizarse solo o con otros herbicidas sobre diferentes cultivos en distintos estados de desarrollo.

ENKIL / DIFLUFENICAN

PRINCIPIO ACTIVO	DIFLUFENICAN
CONCENTRACIÓN	50%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	5 L

Herbicida pre y postemergente - Controla malezas de hoja ancha en aplicación pre-emergente en cultivo de girasol y post-emergente en pasturas y barbecho químico. Las malezas afectadas muestran una marcada decoloración y mueren en un plazo de 5 días. La principal vía de absorción en las malezas es por vía hipocótilo. Cultivos: girasol, pasturas, barbechos.

ACADEMIX LV EC / DE 2,4-D

PRINCIPIO ACTIVO	ÉSTER ETILHEXÍLICO DE 2,4-D
CONCENTRACIÓN	89%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida selectivo de baja volatilidad, sistémico para la aplicación en post-emergencia de malezas de hoja ancha en cultivos de cereales, caña de azúcar, campos naturales y pasturas de gramíneas.

ECLIPSE / FLUMIOXAZIM

PRINCIPIO ACTIVO	FLUMIOXAZIM
CONCENTRACIÓN	48%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	5 L - 4 unidades

Herbicida pre-emergente para combatir malezas en los cultivos de soja, sorgo granífero, trigo, cerezas, ciruelas, cítricos o citrus, damasco, durazno, pelon, vid, girasol y maíz.

BERSAM / FLUMETSULAM

PRINCIPIO ACTIVO	FLUMETSULAM
CONCENTRACIÓN	12%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	10 L

Herbicida selectivo para malezas de hoja ancha en cultivos como soja, poroto, pasturas y caña de azúcar. Se aplica al suelo o en post-emergencia y requiere buena humedad para lograr un control eficaz. La falta de lluvias puede reducir su efectividad y generar escapes de malezas.

ROMEL / FLUROCLORIDONA

PRINCIPIO ACTIVO	FLUROCLORIDONA
CONCENTRACIÓN	25 %
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida residual y post-emergente temprano. Controla muchas malezas, especialmente de hoja ancha. Actúa inhibiendo enzimas, penetra por cotiledones, hojas jóvenes y raíces, y se traslada hacia hojas y tallos provocando la muerte de las malezas. Se usa en soja, arroz, poroto, caña de azúcar, girasol, papa, algodón, maíz y trigo.

ENTORNO / FLUROXIPIR-MEPTIL

PRINCIPIO ACTIVO	FLUROXIPIR-MEPTIL
CONCENTRACIÓN	48 %
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	10 L

Herbicida sistémico, de acción hormonal, recomendado para el control de malezas latifoliadas en barbecho químico, cultivos de cereales, cebolla, citrus, frutales de pepita y caña de azúcar.



HERBICIDAS



SYSMO / FOMESAFEN

PRINCIPIO ACTIVO	FOMESAFEN
CONCENTRACIÓN	26.25%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha, en los cultivos de soja, maní y poroto. Actúa por contacto, por lo que se debe realizar una buena aplicación.

MIFOS ULTRA / GLIFOSATO

PRINCIPIO ACTIVO	GLIFOSATO
CONCENTRACIÓN	66,2%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	1 L y 20 L

Herbicida no selectivo. Indicado especialmente para el control post-emergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes de áreas agrícolas y no cultivadas. SISTÉMICO.

MIFOS GRAN / GLIFOSATO

PRINCIPIO ACTIVO	GLIFOSATO
CONCENTRACIÓN	75,7%
FORMULACIÓN	Granulado Soluble
PRESENTACIÓN	10 kg

Herbicida no selectivo. Indicado especialmente para el control post-emergente de la mayoría de las malezas anuales y perennes de áreas agrícolas y no cultivadas. SISTÉMICO.

LOBUNO / GLUFOSINATO DE AMONIO

PRINCIPIO ACTIVO	GLUFOSINATO DE AMONIO
CONCENTRACIÓN	20%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida post-emergente selectivo en aplicaciones de cobertura total solamente sobre maíces que indiquen la posibilidad de dicho uso en los rótulos y en las bolsas de semillas híbridas de maíz resistentes al glufosinato de amonio. SISTÉMICO Y CONTACTO, POST-EMERGENCIA DE MALEZAS.

ANGLAT / HALOXIFOP

PRINCIPIO ACTIVO	HALOXIFOP
CONCENTRACIÓN	54%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	5 L

Herbicida graminicida post-emergente de acción sistémica selectivo para cultivos de soja, girasol, maní, poroto y algodón. Controla malezas gramíneas perennes y anuales. SISTÉMICO, POST-EMERGENTE DE MALEZAS, INHIBIDOR DE LA ACCasa.

NOMADE / IMAZETAPIR

PRINCIPIO ACTIVO	IMAZETAPYR
CONCENTRACIÓN	10,6%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida selectivo con acción residual, en aplicaciones post-emergentes en los cultivos de soja, maní, alfalfa, arveja, maíz resistente a imidazolinonas, y en aplicaciones pre-emergentes en el cultivo de poroto. SISTÉMICO, POST-EMERGENTE DE MALEZAS, INHIBIDOR DE ALS.

HUNKY / IMAZAPIR

PRINCIPIO ACTIVO	IMAZAPIR
CONCENTRACIÓN	30,6%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	10 L

Herbicida sistémico para uso pre- y post-emergente de las malezas con acción residual y de control, utilizado en cultivos de caña de azúcar y girasol tolerantes a las imidazolinonas, así como en pre-plantación de pino taeda.



HERBICIDAS



LINUCHEM / LINURON

PRINCIPIO ACTIVO	LINURON
CONCENTRACIÓN	50%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida selectivo, se aplica en gran número de cultivos, para el control simultáneo de malezas de hoja ancha y angosta (pastos y gramíneas), después de la siembra y antes de la germinación del cultivo (herb. de preemergencia) o cuando las plantas del cultivo y las malezas han aparecido sobre la superficie del suelo (herb. de postemergencia).

SUNSET/ METRIBUZIN

PRINCIPIO ACTIVO	METRIBUZIN
CONCENTRACIÓN	70%
FORMULACIÓN	Gránulos Dispersables
PRESENTACIÓN	5 kg - 2 unidades

Herbicida de acción sistémica y residual mediante aplicación en pre-emergencia y post-emergencia. Posee amplio espectro de control de malezas, tanto gramíneas como latifoliadas. SISTEMICO, PRE Y POST-EMERGENCIA DE MALEZAS, INHIBIDOR DE LA FOTOSINTESIS EN EL FOTOSISTEMA II.

SUNSET SC / METRIBUZIN

PRINCIPIO ACTIVO	METRIBUZIN
CONCENTRACIÓN	48%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida de acción sistémica y residual mediante aplicación en pre-emergencia y post-emergencia. Posee amplio espectro de control de malezas, tanto gramíneas como latifoliadas. SISTÉMICO, PRE Y POST-EMERGENCIA DE MALEZAS, INHIBIDOR DE LA FOTOSINTESIS EN EL FOTOSISTEMA II.

ERRASIN WP / METSULFURON METIL

PRINCIPIO ACTIVO	METSULFURON METIL
CONCENTRACIÓN	60%
FORMULACIÓN	Polvo Mojable
PRESENTACIÓN	100 g

Herbicida sistémico, post-emergente de malezas, para el control de malezas latifoliadas en trigo, en aplicaciones post-emergentes tempranas. SISTÉMICO, POST-EMERGENTE DE MALEZAS, INHIBIDOR DE ALS.

GALGOQUAT 27,6 SL / PARAQUAT

PRINCIPIO ACTIVO	PARAQUAT
CONCENTRACIÓN	27,6%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida de contacto para aplicaciones en post-emergencia. Actúa interrumpiendo la fotosíntesis. Su uso principal es desecar todo tipo de cultivos, también en barbechos y para áreas no cultivables. CONTACTO Y POST-EMERGENTE DE MALEZAS. INHIBIDOR DEL FOTOSISTEMA I.

ERAWAN / PENDIMETALIN

PRINCIPIO ACTIVO	PENDIMETALIN
CONCENTRACIÓN	33%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	5 L

Herbicida del grupo de las dinitroanilinas, selectivo para los cultivos de maní, algodón, girasol, arveja, cebolla, tomate, tabaco, zanahoria, ajo, soja, poroto, arroz, maíz, y trigo. Inhibe la germinación de las malezas susceptibles. Estas mueren poco después de haber germinado ó luego de la emergencia.

PLENUS / PICLORAM

PRINCIPIO ACTIVO	PICLORAM
CONCENTRACIÓN	27,8%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	5 L

Herbicida sistémico, de acción hormonal, selectivo para cereales, caña de azúcar, lino y praderas de gramíneas, que controla malezas de hoja ancha, anuales y perennes. SISTÉMICO, POST-EMERGENTE DE MALEZAS. AUXINA SINTÉTICA.



HERBICIDAS



GLENN / S-LACTOFEN

PRINCIPIO ACTIVO	S-LACTOFEN
CONCENTRACIÓN	36%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	5 L

Herbicida postemergente de contacto, selectivo para cultivo de maní y soja, controla malezas latifoliadas. Cuando es absorbido por las partes verdes de las malezas se activa por la luz, destruyendo la membrana celular, lo que produce una necrosis de los tejidos vegetales. Comienza a actuar a la ½ hora de ser aplicado. Cultivos: Soja y maní.

CHEMOCLOR / S-METOLACLORO

PRINCIPIO ACTIVO	S-METOLACLORO
CONCENTRACIÓN	96%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida de acción pre-emergente para cultivos extensivos como algodón, girasol, maíz, maní, soja, poroto, sorgo granífero, tabaco, así como también en cultivos hortícolas y césped. SISTÉMICO, SE ABSORBE POR TALLOS, POR EL HIPOCOTILE Y EL COLEOPTILE. PRE-EMERGENTE DE MALEZAS. INHIBIDORES DE LA MITOSIS.

SUPER AZON / SULFENTRAZONE

PRINCIPIO ACTIVO	SULFENTRAZONE
CONCENTRACIÓN	50%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	10 L

Herbicida pre-emergente para el control de malezas de hoja ancha del grupo de las "aril triazolinonas", que se absorbe por las raíces de las plantas tratadas. Es selectivo para el cultivo de soja, maní y girasol, aplicándose en pre-emergencia del cultivo y malezas, controlándolas eficazmente. CONTACTO Y PRE-EMERGENTE DE MALEZAS, INHIBIDORES DE PPO.

TERBUCHEM 50 SC / TERBUTILAZINA

PRINCIPIO ACTIVO	TERBUTILAZINA
CONCENTRACIÓN	50%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	20 L

Herbicida pre y post-emergente, selectivo, para el control de malezas de hoja ancha en cultivos de maíz, cítricos, garbanzo, arveja, haba, lupino, lenteja, vicia, poroto mung, avena, centeno, trigo, cebada, algodón, maní, vid y forestales (Eucaliptus sp. y Pinus sp.).



INSECTICIDAS



OLIMPO MAXX / ABAMECTINA

PRINCIPIO ACTIVO	ABAMECTINA
CONCENTRACIÓN	3,6%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Acaricida-insecticida de origen natural, actúa por ingestión, por contacto directo y de movimiento translaminar. Acción curativa y preventiva.

MARDER / ACETAMIPRID - LAMBDAHALOTRINA

PRINCIPIO ACTIVO	ACETAMIPRID - LAMBDAHALOTRINA
CONCENTRACIÓN	Acetamiprid 2% y Lambda-halotrina 2%
FORMULACIÓN	Dispersión Oleosa
PRESENTACIÓN	10 L

Insecticida foliar que por la acción conjunta de sus dos principios activos acetamiprid (neonicotinoide) y lambda-halotrina (piretroide), cubre un amplio espectro, con acción sistémica y residual. Controla los organismos por ingestión y contacto. Posee alto poder de volteo y propiedades repelentes.

PARALELO 25 EC / BIFENTRIN

PRINCIPIO ACTIVO	BIFENTRIN
CONCENTRACIÓN	25%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Controla insectos chupadores y masticadores en distintos cultivos.

GALGOTRIN / CIPERMETRINA

PRINCIPIO ACTIVO	CIPERMETRINA
CONCENTRACIÓN	25%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Insecticida a base de cipermetrina, actúa por contacto e ingestión para el control de insectos. La cipermetrina posee acción de repelencia y es de moderada toxicidad para seres de sangre caliente.

ÉPICO / CLORANTRANILIPROLE

PRINCIPIO ACTIVO	CLORANTRANILIPROLE
CONCENTRACIÓN	20%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	1 L

Insecticida de la familia química Diamidas Antranílicas. Actúa como ovicida, larvicida y adulticida. Puede ser usado como parte de un programa de MIP, complementando prácticas tales como control biológico, genético, técnicas de confusión sexual, etc. Es adecuado también para no afectar a los insectos benéficos cuando es utilizado de acuerdo a las indicaciones. Ideal para el control de plagas en cultivos como algodón, duraznero, girasol, maíz, manzano, peral, soja, tomate y vid.

FOZIL 35 / IMIDACLOPRID

PRINCIPIO ACTIVO	IMIDACLOPRID
CONCENTRACIÓN	35%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Insecticida sistémico, actúa por ingestión y contacto, específico para el control de insectos como pulgones, mosquita blanca, trips y otros, que afectan a cultivos de cereales, frutales de carozo, cítricos, tabaco, hortalizas y ornamentales.

SIMBIOSIS MAXX / IMIDACLOPRID + LAMBDAHALOTRINA

PRINCIPIO ACTIVO	IMIDACLOPRID 20% + LAMBDAHALOTRINA 20%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	10 L

Permite ampliar el control de plagas de diferentes órdenes de insectos bajo el uso de un solo producto, combina tres ingredientes activos de acción complementaria: dos piretroides (lambda-halotrina y bifentrin) y un neonicotinoide (imidacloprid), otorgando acción rápida (poder de volteo) y efecto prolongado (residualidad) en el control de chinches y otras plagas del cultivo de soja.





NEMESIS / LUFENURON

PRINCIPIO ACTIVO	LUFENURON
CONCENTRACIÓN	5%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	5 L

Insecticida regulador del crecimiento de los insectos que interfiere con la síntesis de la quitina. Modo de acción específico para artrópodos, inhibiendo el crecimiento de larvas, especialmente de lepidópteros y de coleópteros. En algunos insectos actúa también como ovicida.

RAFTER 25 ME / LAMBDAALOTRINA

PRINCIPIO ACTIVO	LAMBDAALOTRINA
CONCENTRACIÓN	25%
FORMULACIÓN	Microemulsión
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Insecticida piretroide, actúa por contacto, ingestión y repelencia para el control de larvas y adultos de insectos masticadores, picadores y chupadores, afectando además la oviposición de ellos. Posee un largo efecto residual y amplio espectro de acción.

VELOX / TIAMETOXAM-LAMBDAALOTRINA

PRINCIPIO ACTIVO	TIAMETOXAM-LAMBDAALOTRINA
CONCENTRACIÓN	Tiametoxam 14,1% y Lambdaalotrina 10,6%
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada y suspensión de encapsulado
PRESENTACIÓN	5 L

Insecticida foliar de amplio espectro, integrado por dos principios activos que poseen características complementarias. El tiametoxam es un neonicotinoide sistémico de alta residualidad, que controla insectos succionadores, mientras la lambdaalotrina es un piretroide que actúa sobre insectos succionadores y masticadores, otorgando poder de volteo. De esta manera, se caracteriza por su buen poder de volteo y persistencia de control.



FUNGICIDAS



CRUX / AZOXISTROBINA+CIPROCONAZOLE

PRINCIPIO ACTIVO	AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOLE
CONCENTRACIÓN	AZOXISTROBINA 20% + CIPROCONAZOLE 8%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	5 L

Las cualidades preventivas de Azoxistrobina y el efecto curativo de Ciproconazole dan plasticidad para permitir el control de los patógenos durante todo su ciclo de desarrollo. Se recomienda que la aplicación se realice a la aparición de los primeros síntomas de enfermedad.

FUGAZ / AZOXISTROBINA

PRINCIPIO ACTIVO	AZOXISTROBINA
CONCENTRACIÓN	25%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Fungicida sistémico y de contacto, perteneciente al grupo químico de los metoxiacrilatos, con acción preventiva, curativa y antiesporulante.

SINFONIA / AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE

PRINCIPIO ACTIVO	AZOXISTROBINA + DIFENOCONAZOLE
CONCENTRACIÓN	AZOXISTROBINA 20% + DIFENOCONAZOLE 12,5%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	5 L

Fungicida para cultivos de soja, girasol, maní, papa, frutas de carozo, frutilla, arándanos, vid, pimienta, tomate.

ENAZIN / CARBENDAZIM

PRINCIPIO ACTIVO	CARBENDAZIM
CONCENTRACIÓN	50%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	10 L

Fungicida bencimidazol. Posee acción sistémica, preventiva y curativa. Penetra rápidamente en los tejidos vegetales destruyendo las estructuras de los hongos ya establecidos y permanece en la planta protegiéndola de posibles infestaciones.

TOLLER 72 / CLOROTALONIL

PRINCIPIO ACTIVO	CLOROTALONIL
CONCENTRACIÓN	72%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	10 L

Fungicida de contacto, formulado en base al activo clorotalonil. Posee acción preventiva y curativa sobre enfermedades fúngicas que afectan a cultivos extensivos, como maní, papa, trigo, soja, y cultivos hortícolas y frutales.

REDOMON / FLUAZINAM

PRINCIPIO ACTIVO	FLUAZINAM
CONCENTRACIÓN	50%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	20 L

Se usa para el control de Sclerotinia en los cultivos de Poroto y maní, Tizón tardío de la papa y Podredumbre gris en Vid. Forma una película protectora en la hoja provocando una mayor acción residual que resiste al lavado por lluvias.

TREPAK / PROPAMOCARB CLORHIDRATO

PRINCIPIO ACTIVO	PROPAMOCARB CLORHIDRATO
CONCENTRACIÓN	72,2%
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Fungicida sistémico para control de hongos de la clase Oomycetes: Pythium, Aphanomyces, Phytophthora, Peronospora y Bremia, causantes de la caída de almácigos podredumbre del tallo y mildiú.

TRIGAL 43 SC / TEBUCONAZOLE

PRINCIPIO ACTIVO	TEBUCONAZOLE
CONCENTRACIÓN	43%
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada
PRESENTACIÓN	1 L - 5 L

Fungicida orgánico de acción preventiva, curativa y erradicante. Inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo. Amplio espectro de acción destacándose en el control de enfermedades en trigo y otros cereales: fusariosis, septoriosis, royas y oidios, aumentando el rendimiento y calidad de la cosecha.



FEROMONAS



CIDETRAK CM AR / DODECADIENOL

PRINCIPIO ACTIVO	DODECADIENOL (Evaporable)
CONCENTRACIÓN	2 %
DOSIS	1000 unidades/ha
PRESENTACIÓN	400 u/bolsa; 4 bolsas/caja

Feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Controla única y exclusivamente *Cydia pomonella*. No deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

CIDETRAK CM PLUS AR / DODECADIENOL

PRINCIPIO ACTIVO	DODECADIENOL (Evaporable)
CONCENTRACIÓN	3,08%
PRESENTACIÓN Y DOSIS	LARGO PVC 5cm- 1000u/ha LARGO PVC 25cm- 80u/ha
	INCLUYENDO BORDURA

Feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Controla única y exclusivamente *Cydia pomonella*. No deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

CIDETRAK CM PLUS MESO AR / DODECADIENOL

PRINCIPIO ACTIVO	DODECADIENOL (Evaporable)
CONCENTRACIÓN	3,08%
PRESENTACIÓN Y DOSIS	LARGO PVC 5cm- 1000u/ha LARGO PVC 25cm- 80u/ha
	INCLUYENDO BORDURA

Feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Controla única y exclusivamente *Cydia pomonella*. No deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

CIDETRAK CM DA COMBO AR / DODECADIENOL + DECADIENOATO

PRINCIPIO ACTIVO 1	DODECADIENOL 2,44%	(Evaporable)
PRINCIPIO ACTIVO 2	DECADIENOATO 0,67%	
DOSIS	500 unidades/ha	
PRESENTACIÓN	400 u/bolsa; 4 bolsas/caja	

Feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Controla exclusivamente *Cydia pomonella* y *Grafolita molesta*. No deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

CIDETRAK CM OFM DUO AR / DODECADIENOL + DODECENIL ACETATO

PRINCIPIO ACTIVO 1	DODECADIENOL 4,60%	(Evaporable)
PRINCIPIO ACTIVO 2	DODECENIL ACETATO 2%	
DOSIS	500 unidades/ha	
PRESENTACIÓN	400 u/bolsa; 4 bolsas/caja	

Feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Controla exclusivamente *Cydia pomonella* y *Grafolita molesta*. No deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

CIDETRAK DA MEC AR / DECADIENOATO

PRINCIPIO ACTIVO	DECADIENOATO (Líquido)
CONCENTRACIÓN	5%
DOSIS	1 cm ³ cada 100 l de agua
PRESENTACIÓN	Botella de 240CC

Feromona de atracción en conjunto de otros insecticidas para el control del Gusano de la Pera y la Manzana (*Cydia pomonella*) en el momento recomendado para la aplicación del mismo.



FEROMONAS



CIDETRAK EGVM AR / DODECADIENIL ACETATO

PRINCIPIO ACTIVO	DODECADIENIL ACETATO (Evaporable)	
CONCENTRACIÓN	3,5%	
PRESENTACIÓN	LARGO PVC 5cm- 350u/ha	INCLUYENDO BORDURA
DOSIS	LARGO PVC 16cm- 80u/ha	

Feromona que genera trastornos en la comunicación sexual entre polillas adultas (*Lobesia botrana*) masculinas y femeninas, reduce la fertilidad del desove, inhibe la posterior infestación de las larvas y reduce la necesidad de aplicar insecticidas

PHEROCON CM DA COMBO AR / DODECADIENOL + DECADIENOATO

PRINCIPIO ACTIVO 1	DODECADIENOL	(Evaporable)
PRINCIPIO ACTIVO 2	DECADIENOATO	
CONCENTRACIÓN	0,45% 0,45%	
DOSIS	1 un/ cada 2 ha	
PRESENTACIÓN	3 kit /Bolsa; 25 u repuesto/bolsa	

La trampa de PHEROCON CM DA COMBO AR permite destacar la presencia de la plaga en el monte frutal por acción del atractivo sexual (feromona) que posee el cabo de la misma. Las cápsulas cebo están impregnadas con una cantidad precisa del atractivo sexual que las hembras liberan para atraer a los machos, y fueron específicamente preparadas para el insecto que se desea capturar. Son inodoras al ser humano. A través de este sistema se determina el momento oportuno para pulverizar el monte frutal. De este modo se logra un uso racional y efectivo de los insecticidas.

PHEROCON OFM AR / DODECENIL ACETATE

PRINCIPIO ACTIVO	DODECENIL ACETATE (Evaporable)
CONCENTRACIÓN	0,00011 %
DOSIS	1-8 ha. Colocar 1 trampa c/ 2 ha 9-18 ha. Colocar 1 trampa c/ 4 ha 17-32 ha. Colocar 1 trampa c/ 7 ha Más de 32 ha. 1 trampa c/ 8 ha
PRESENTACIÓN	400 Unidades/Bolsa; 4 Bolsas/Caja

La trampa PHEROCON OFM AR permite detectar y monitorear la presencia de la plaga, Gusano del brote del duraznero (*Grapholita molesta*), en el monte frutal por la acción de su atractivo sexual (Feromona) que posee el cebo de la misma. Las cápsulas-cebo están impregnadas con una cantidad precisa del atractivo sexual que las hembras liberan para atraer a los machos. Fueron específicamente preparadas para el insecto que se desea capturar. Son inodoras al ser humano. A través de este sistema se determina el momento oportuno para pulverizar el monte frutal. De este modo se logra un uso racional y efectivo de los insecticidas, siendo este un recurso fundamental en los métodos de Control Integrado de Plagas.



COADYUVANTE



GALGOIL 78 / ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE VEGETAL

PRINCIPIO ACTIVO	ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE VEGETAL
CONCENTRACIÓN	78%
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable
PRESENTACIÓN	20 L

Acrecienta el poder mojable de los caldos preparados primordialmente a base de herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y fitoreguladores. Por su principio activo de origen vegetal, lo ideal para minimizar la deriva y optimizar la adherencia, dispersión en las superficies de las plantas y de las plagas sobre las cuales se aplica.

FITOREGULADOR

NAGIB 10 / ÁCIDO GIBERÉLICO

PRINCIPIO ACTIVO	ÁCIDO GIBERÉLICO
CONCENTRACIÓN	10%
FORMULACIÓN	Polvo Soluble
PRESENTACIÓN	100g

Fitohormona que se encuentra naturalmente en las plantas. Aplicada sobre los vegetales, actúa como un fitoregulador del crecimiento, caracterizado por efectos fisiológicos y morfológicos. Actúa a concentraciones extremadamente bajas, es translocada en el interior de la planta y, generalmente, solo afecta a las partes aéreas. Su efecto más claro consiste en acelerar el crecimiento vegetativo de los brotes, produciendo plantas más grandes.



NÚMEROS DE EMERGENCIA

- **+54 341-448-0077**

CENTRO TOXICOLÓGICO TAS (24hs)

- **+54 341-424-2727**

CENTRO TOXICOLÓGICO TAS (24hs)

- **0800-888-8694**

CENTRO TOXICOLÓGICO TAS (24hs)

LINKS DE INTERÉS



www.argentina.gob.ar/senasa



www.ciafa.org.ar



www.campolimpio.org.ar

- CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO -

* PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
LEA ATENTAMENTE LAS ETIQUETAS DE CADA PRODUCTO.



González y Aragón 207 . Ruta 205 km 43.5
(B1812EIE) Carlos Spegazzini Prov. de Bs As.
(011) 7090-4700 . 0800-362-0500
info@chemotecnica.com



chemotecnica.com

